

Фонд оценочных средств
для подготовки к государственной итоговой аттестации
по специальности ординатуры «Неврология».

Тестовые задания

Укажите один правильный ответ

001	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА НЕ ПРОВОДЯТ С:
А	синдромом Персонейдж-Тернера
Б	миопитией
В	спинальными амиотрофиями
Г	БАС
002	МИОТОНИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
А	замедленная реакция мышцы после её сокращения
Б	медленное «вработывание» мышцы
В	перманентное тоническое сокращение мышцы
Г	Патологическая мышечна утомляемость
003	НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЕСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЭТИОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННОЕ С ГЕМОМРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ:
А	гипертоническая болезнь
Б	сахарный диабет
В	атеросклероз
Г	артериальная гипотония
004	В ПАТОГЕНЕЗЕ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО ПЕРИАРТРОЗА ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПАТОЛОГИЯ:
А	надостной мышцы
Б	подостной мышцы
В	подлопаточной мышцы
Г	околосуставной сумки
005	ДЛЯ МИАСТЕНИИ ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ:
А	Пре- и постсинаптической мембраны
Б	постсинаптической мембраны
В	пресинаптической мембраны
Г	Мышечного воловна
006	ВТОРАЯ СТАДИЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
А	по наличию субъективных и объективных проявлений
Б	по наличию объективных проявлений
В	по наличию субъективных проявлений
Г	По наличию леменции

007	ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ СПОНДИЛОКАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ:
А	В и Г
Б	грудного отдела позвоночника
В	шейного отдела позвоночника
Г	Поясничного отдела позвоночника
008	К ПИТРС относится препарат
А	Копаксон
Б	Актовегин
В	Мексидол
Г	Церебролизин
009	ПРИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ:
А	менингеальный синдром
Б	бульбарный синдром
В	псевдобульварный синдрома
Г	Моторной афазии
010	ПОЗДНЯЯ МОЗЖЕЧКОВАЯ АТРОФИЯ МАРИ-ФУА-АЛАЖУАНИНА ИМЕЕТ
А	доминантный тип наследования
Б	рецессивный тип наследования
В	спорадический характер
Г	Наследование, сцепленное с полом
011	В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ:
А	циннаризина
Б	ноотропов
В	витаминов
Г	актовегина
012	НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ОСТЕОХОНДРОЗА:
А	миоадаптивный
Б	рефлекторный
В	компрессионный
Г	сосудистый
013	ВЫДЕЛИТЕ НЕВЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДЛЯ ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ:
А	почечных расстройств
Б	психических
В	нервных
Г	экстрапирамидных

014	ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ:
А	простой вирус типа 1
Б	простой вирус типа 2
В	герпес-зостер
Г	Вирус Эпштейна Бара
015	ДИАГНОЗ ПРЕХОДЯЩЕГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕРЕЗ:
А	сутки
Б	неделю
В	месяц
Г	Через 2 суток
016	ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ ПАТОЛОГИЮ:
А	все утверждения верны
Б	мышцы
В	синапса
Г	Переднего рога
017	ВОЗБУДИТЕЛЬ АКТИМИНОКОЗА ОБИТАЕТ В ПОЛОСТИ:
А	рта
Б	носа
В	уха
Г	глотки
018	ОПУХОЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЧАЩЕ
А	типа неврином
Б	в виде злокачественных сарком
В	в виде ангиом
Г	эпителиом
019	ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЧМТ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ:
А	сотрясение головного мозга
Б	лёгкая степень
В	ушиб
Г	Диффузное аксональное повреждение
020	ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФЕНОМЕНА РЕЙНО ЯВЛЯЕТСЯ:
А	реовазография
Б	рентгенография дистальных отделов позвоночника
В	рентгенография шейного отдела позвоночника

Г	Общий анализ крови
021	ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ОПТОХИАЗМАЛЬНОГО АРАХНОИДИТА ХАРАКТЕРНО:
А	прогрессирующая потеря зрения
Б	стабильная слепота
В	воспалительные изменения на глазном дне
Г	гемианопсия
022	В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ НЕВРАСТЕНИИ ПРЕВАЛИРУЕТ:
А	вегетативная дистония
Б	анестезия по гемитипу
В	нейрогенная тетания
Г	Конверсионные расстройства
023	ТУННЕЛЬНЫЕ СИНДРОМЫ ЧАЩЕ РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ:
А	в третьем триместре
Б	во втором триместре
В	корешковые
Г	В первом триместре
024	АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРЕННОМУ ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ:
А	задержка функции тазовых органов
Б	парализующий ишиас
В	корешковые боли
Г	Нарушение чувствительности
025	ПРИ ИСТЕРИЧЕСКИХ ПАРАЛИЧАХ:
А	рефлекторная сфера не изменена
Б	Высокие сухожильные рефлексы
В	снижены сухожильные рефлексы
Г	Определяются патологические рефлексы
026	ПРИ ДИФТЕРИИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ:
А	бульбарный синдром
Б	гемипарез
В	монопарез
Г	атаксия
027	ТРИГЕМИНАЛЬНЫЕ БОЛИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ АНЕВРИЗМЫ:
А	в вертебробазиллярном бассейне
Б	в бассейне средней мозговой артерии
В	в бассейне передней мозговой артерии
Г	В глубине полушарий

028	ЗАСТОЙНЫЕ ДИСКИ ЗРИТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ ОПУХОЛИ:
А	конвекситальных отделов лобной доли
Б	ствола мозга
В	теменной доли
Г	Затылочной доли
029	ЕДИНИЧНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧАЩЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ ОПУХОЛИ:
А	желудка
Б	матки
В	лёгких
Г	Предстательной железы
030	РЕФЛЕКТОРНЫЙ НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ СИНДРОМ:
А	синдром позвоночной артерии
Б	синдром передней лестничной мышцы
В	синдром «плечо-кисть»
Г	Синдром грушевидной мышцы
031	ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО- МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ:
А	В течение 3 лет после последнего припадка
Б	не назначаются
В	в течение 6 месяцев после последнего припадка
Г	Назначаются пожизненно
032	В ЛЕЧЕНИИ КОМПРЕССИОННЫХ КОРЕШКОВЫХ СИНДРОМОВ ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ВЕДУЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ:
А	консервативное лечение
Б	хирургический метод
В	мануальная терапия
Г	психотерапия
033	АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛИ В:
А	в стволе мозга
Б	в области мостомозжечкового угла
В	лобной доле
Г	В теменной доле
034	ЛИКВОР ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ:
А	прозрачный

Б	со свежей кровью
В	ксантохромный
Г	С высоким белком
035	ОШИБОЧНОЙ ТАКТИКОЙ В ЛЕЧЕНИИ ТУННЕЛЬНЫХ НЕВРОПАТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ:
А	ганглиоблокаторов
Б	сосудоактивных препаратов
В	дегидратационных препаратов
Г	церебролизина
036	НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ АМИНОКИСЛОТНОГО ОБМЕНА ЛЕЧАТСЯ В ОСНОВНОМ:
А	диетой
Б	медикаментозно
В	оперативно
Г	Сосудистыми препаратами
037	ЛЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА ОСНОВАНО НА ПРИМЕНЕНИИ:
А	стероидных гормонов
Б	антибиотиков
В	ноотропов
Г	витаминов
038	ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ГАММА-ГЛОБУЛИНА В ОСТРОЙ СТАДИИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ:
А	гипертермия
Б	менингеальный синдром
В	бульбарный синдром
Г	кома
039	ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ КОРТИКОСТЕРОИДАМИ ПОКАЗАНО:
А	При тяжелых обострениях заболевания
Б	В период ремиссии
В	независимо от стадии болезни
Г	В дебюте заболевания
040	ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА МИГРЕНИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ:
А	Эрготаминсодержащие препараты
Б	НПВСП
В	Антидепрессанты
Г	Сосудоактивные препараты
041	ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КАРОТИДНОЙ

	ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ:
А	Восстановительный период ишемического инсульта
Б	Наличие тандемных стенозов
В	Инфаркт миокарда в анамнезе
Г	Пониженная фракция выброса
042	ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ СТАДИИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ПРОВОДИТСЯ:
А	гамма-глобулином
Б	антибиотиками
В	Стероидными гормонами
Г	антибиотиками
043	В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
А	препараты L-ДОФА и агонисты рецепторов дофамина
Б	центральные холинолитики
В	Препараты дофамина
Г	антибиотики
044	ТЕРАПИЯ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК В МЕЖПРИСТУПНОМ ПЕРИОДЕ БАЗИРУЕТСЯ НА ПРИМЕНЕНИИ:
А	длительных курсов антиагрегантов
Б	коротких курсов антиагрегантов
В	антикоагулянтов прямого действия
Г	Вазоактивных препаратов
045	ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭНЦЕФАЛИТАХ ЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
А	С лечебно-диагностической целью
Б	только с диагностической целью
В	противопоказана
Г	Только с лечебной целью
046	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ КУРАНТИЛА
А	язвенная болезнь желудка
Б	низкое артериальное давление
В	присоединение пневмонии
Г	Пожилой возраст
047	ВЫБРАТЬ ОШИБОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ГЕПАРИН ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ:
А	инфаркте миокарда в анамнезе
Б	язвенной болезни желудка
В	нарушении ритма сердца
Г	В пожилом возрасте

048	НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ СИФИЛИСЕ ЛЕЧАТСЯ ПЕНИЦИЛЛИНОМ В СУТОЧНОЙ ДОЗЕ
А	20 млн Ед
Б	10 млн Ед
В	1 млн Ед
Г	40 млн Ед
049	ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛИРАДИКУЛОНЕЙРОПАТИИ ГИЙЕНА-БАРРЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
А	плазмаферез
Б	кортикостероиды
В	антибиотики
Г	витамины
050	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ ПОКАЗАНО ПРИ ГЕМАТОМАХ:
А	латеральных
Б	медиальных
В	любой локализации
Г	обширных
051	В ЛЕЧЕНИИ МИГРЕНОЗНОГО СТАТУСА ИСПОЛЬЗУЮТ:
А	эрготамин
Б	трентал
В	кавинтон
Г	церебролизин
052	ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ КОРТИКОСТЕРОИДАМИ ПОКАЗАНО:
А	При тяжелых обострениях заболевания
Б	в период ремиссии
В	независимо от стадии болезни
Г	В начале заболевания
053	ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ ЛЕЧИТСЯ:
А	пенициламином
Б	диетой с высоким содержанием меди
В	антихолинэстеразными препаратами
Г	витаминами
054	ПРИ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРИПАДКАХ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ:
А	карбамазепины

Б	препараты вальпроевой кислоты
В	препараты барбитуровой кислоты
Г	тосуксимид
055	ЛЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА ОСНОВАНО НА ПРИМЕНЕНИИ:
А	Стероидных гормонов
Б	Антибиотиков
В	Ноотропов
Г	ангиопротекторов
056	ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГБН ИСПОЛЬЗУЮТ:
А	все верно
Б	миорелаксанты
В	антидепрессанты
Г	психотерапию
057	ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА МИГРЕНИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ:
А	Эрготаминсодержащие препараты
Б	Антидепрессанты
В	НПВС
Г	Сосудистые препараты
058	. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО:
А	Трициклические антидепрессанты и ингибиторы МАО
Б	Нейролептики и трициклические антидепрессанты
В	Нейролептики и бензодиазепины
Г	Антибиотики и СИОЗС
059	ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАНИЧЕСКИХ АТАК ИСПОЛЬЗУЮТ:
А	Все верно
Б	Антидепрессанты
В	бензодиазепины
Г	Поведенческая терапия
060	КЛОНАЗЕПАМ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ:
А	Все верно
Б	Панических атаках
В	Торсионной дистонии
Г	миоклонических синдромах
061	ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ:
А	В течение 3 лет после последнего припадка
Б	Не назначаются

В	В течение 6 месяцев после последнего припадка
Г	На всю жизнь
062	ОШИБОЧНОЙ ТАКТИКОЙ В ЛЕЧЕНИИ ТУННЕЛЬНЫХ НЕВРОПАТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ:
А	ганглиоблокаторов
Б	сосудоактивных препаратов
В	дегидратационных препаратов
Г	Витаминов
063	НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ АМИНОКИСЛОТНОГО ОБМЕНА ЛЕЧАТСЯ В ОСНОВНОМ:
А	диетой
Б	оперативно
В	медикаментозно
Г	витаминами
064	ПОНЯТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ
А	применение медицинских, психологических, социальных, педагогических и профессиональных
Б	лечебный процесс на амбулаторном и санаторном этапах
В	комплекс медицинских и биологических мероприятий
Г	комплекс медицинских и биологических мероприятий
065	ПОНЯТИЕ ЭРГОТЕРАПИИ ВКЛЮЧАЕТ
А	комплекс мероприятий по восстановлению самообслуживания, работоспособности и отдыха пациента
Б	отдельный вид трудотерапии
В	мероприятия по психологической реадaptации
Г	кинезитерапию
066	РАННИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИНФАРКТА МОЗГА ДЛИТСЯ ДО
А	6-х месяцев
Б	3-х месяцев
В	до года
Г	До 1 месяца
067	ПОЗДНИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИНФАРКТА МОЗГА ДЛИТСЯ ДО
А	до 1 года
Б	3-х месяцев
В	6-х месяцев
Г	До 1 месяца
068	ВТОРИЧНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ ИНСУЛЬТА

	НАЧИНАЮТ
А	с 1-го дня пребывания в стационар
Б	через 2 недели после инсульта
В	через 2 месяцев после инсульта
Г	Через год после инсульта
069	В СОСТАВ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ БРИГАДЫ ВХОДЯТ
А	невролог, инструктор-методист, клинический психолог, логопед
Б	хирург, ортопед, гастроэнтеролог, невролог
В	невролог, психиатр, логопед, ортопед
Г	Невролог и психиатр
070	ПАЦИЕНТАМ, ПЕРЕНЕСШИМ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ, В КАЧЕСТВЕ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПОКАЗАНЫ
А	антикоагулянты
Б	антиагреганты
В	вазоактивные средства
Г	тромболитики
071	ПАЦИЕНТАМ, ПЕРЕНЕСШИМ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ, В КАЧЕСТВЕ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПОКАЗАНЫ
А	антиагреганты
Б	антикоагулянты
В	вазоактивные средства
Г	тромболитики
072	СРЕДСТВАМИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ЯВЛЯЮТСЯ
А	глутаматэргические, ацетилхолинэргические препараты
Б	вазоактивные, гипотензивные препараты
В	антиоксиданты, метаболические препараты
Г	Нейротрофические препараты
073	СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ЭТАПОВ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
А	3 этапа
Б	4 этапа
В	5 этапов
Г	2 этапа
074	МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ ВКЛЮЧАЕТ а) б) в)
А	функции, структуры организма, факторы окружающей

	среды, активность и участие пациентов
Б	функции, структуры организма, факторы окружающей среды
В	функции организма, факторы окружающей среды, активность и участие пациентов
Г	функции, структуры организма
075	ЦЕЛЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ
А	специфичная, измеряемая, достижимая, реалистичная, определенная во времени
Б	специфичная, измеряемая, достижимая, реалистичная
В	специфичная, достижимая, реалистичная, определенная во времени
Г	комплексная
076	СКОЛЬКО РАЗ ЧЛЕНЫ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ БРИГАДЫ ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ОБХОДЫ С ОБСУЖДЕНИЕМ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА:
А	не менее 1 раза в неделю
Б	ежедневно
В	2 раза в неделю
Г	При поступлении больного
077	ЗАДАЧАМИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ У ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МОЗГА ЯВЛЯЮТСЯ
А	профилактика пролежней, спастичности и болевого синдрома.
Б	профилактика травмирования суставов парализованных конечностей
В	нормализация мышечного тонуса в парализованных конечностях
Г	Ранняя активизация
078	РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
А	медицинские, биологические, профессиональные
Б	медицинские, психологические, социальные
В	биологические, психологические, профессиональные
Г	семейные и медицинский
079	ПОД РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПОНИМАЮТ
А	медицински обоснованную вероятность достижения определенных целей в определенный отрезок времени
Б	возможность восстановления функций
В	выявление у пациента определенных предикторов восстановления функций
Г	Желание пациента

080	НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
А	эрготерапевт
Б	клинический логопед
В	клинический психолог
Г	психиатр
081	ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПАРАЛИЧА БЕЛЛА
А	все верно
Б	может осложняться “крокодильными слезами”
В	может осложняться лицевыми спазмами
Г	Может сопровождаться расстройством вкуса
082	ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА:
А	Кортикостероиды внутривенно в пульс-дозах (0,5-1 грамм 5-7 дней)
Б	Нестероидные противовоспалительные препараты
В	Кортикостероиды per os с 80 мг постепенно снижая дозу
Г	Антибиотики
083	УКАЖИТЕ, КАКИЕ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНОМ КРОВОИЗЛИЯНИИ?
А	нимодипин
Б	Викасол.
В	Дицинон
Г	Аминомасляная кистота
084	УКАЖИТЕ, КАКОЙ ИЗ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПЕРИОДА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ?
А	Гамма-глобулин
Б	Сыворотка реконвалесцентов
В	Антибиотики.
Г	ангиопротекторы
085	ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ:
А	в течение 3 лет после последнего припадка
Б	в течение 6 месяцев после последнего припадка
В	не назначаются
Г	Назначаются ситуационно
086	СРОКИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНСУЛЬТА В

	УСЛОВИЯХ КУРОРТА:
А	через 3 месяца
Б	через 6 месяцев
В	через 9 месяцев
Г	Через год
087	ЛЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА ОСНОВАНО НА ПРИМЕНЕНИИ:
А	стероидных гормонов
Б	антибиотиков
В	ноотропов
Г	ангиопротекторов
088	ПЕРВЫЙ ОСМОТР ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ НАЗНАЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ:
А	один месяц
Б	один год
В	6 месяцев
Г	Через год
089	В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЭНЦЕФАЛИТА ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ:
А	циннаризина
Б	ноотропов
В	витаминов
Г	нейролептиков
090	АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРЕННОМУ ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ:
А	задержка функции тазовых органов
Б	парализующий ишиас
В	корешковые боли
Г	Нарушение статики
91	ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
А	совершенствование методов профилактики
Б	совершенствование методов лечения в острейший период инсульта
В	совершенствование методов лечения в период реабилитации
Г	разработка новых лекарственных технологий
92	АЛКОГОЛЬНАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ ЛЕЧИТСЯ
А	Сосудистыми препаратами
Б	Витамином В1
В	кортикостероидами

Г	антидепрессантами
93	ЛЕЧЕНИЕ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ПРОВОДИТСЯ
	анальгетиками
	сосудистыми препаратами
	метаболическими препаратами
	противоэпилептическими препаратами
94	ХРОНИЧЕСКИЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ЛЕЧАТ
	антидепрессантами
	сосудистыми препаратами
	анальгетиками
	метаболическими препаратами
95	АЛЬТЕРНИРУЮЩИЕ СИНДРОМЫ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ПОРАЖЕНИИ
	коры больших полушарий
	мозжечка
	внутренней капсулы
	ствола головного мозга
96	ПРИ КОМПРЕССИИ КОНСКОГО ХВОСТА ПРИ ПОЯСНИЧНОЙ ДОРОПАТИИ БОЛЬНОМУ ПОКАЗАНО
	оперативное лечение
	иммобилизация
	массаж
	мануальная терапия
97	ДЛЯ ИСТЕРИИ НЕ ХАРАКТЕРНО
	нарушение функции тазовых органов
	параличи
	атаксия
	слепота
98	ПРИ ПЕРВИЧНО-ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ НЕ БЫВАЕТ
	ауры
	утраты сознания
	падения
	непроизвольного мочеиспускания
99	СЕНСИТИВНАЯ АТАКСИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ
	в темноте
	в сочетании с нистагмом
	в сочетании с головокружением
	в сочетании со скандированной речью

100	БОЛИ ОСОБЕННО ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ
	лобной доли
	переднего корешка спинного мозга
	заднего корешка спинного мозга
	ствола мозга